

# Rak szyjki macicy - Co należy wiedzieć!

Zmieniony 18.04.2010.

## Rak szyjki macicy - Co należy wiedzieć!

Rak szyjki macicy to w Polsce druga po raku sutka przyczyna zgonów kobiet z przyczyn nowotworowych. W ciągu każdego roku nowotwór ten rozpoznawany jest u blisko 4000 Polek, ale dla około połowy z nich jest już za późno.

## Przyczyny

Głównym sprawcą zachorowań na raka szyjki macicy jest wirus HPV tj. Wirus brodawczaka ludzkiego. Najczęściej zakażeniu wirusem HPV ulegają osoby młode, aktywne seksualnie w wieku 18-28 lat. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się wszystkie osoby aktywne seksualnie. Przewiduje się, iż ponad 50% osób dorosłych ulegnie zakażeniu w ciągu całego życia.

## Objawy

Większość zakażeń wirusem HPV przebiega zwłaszcza w początkowej fazie bezobjawowo. Dlatego tak ważne są regularne badania cytologiczne oraz badania na obecność wirusa HPV.

## Profilaktyka

Badaniu na obecność wirusa HPV powinny poddać się kobiety między 20 a 59 rokiem życia. Rak szyjki macicy rzadko występuje przed dwudziestym rokiem życia, jednak po trzydziestym roku życia zachorowalność gwałtownie wzrasta by osiągnąć swój szczyt w wieku 45-55 lat. Natomiast infekcje HPV zdarzają się osobom bardzo młodym a czym dłużej osoba zainfekowana jest wirusem HPV tym większe ryzyko rozwinięcia się nowotworu. Negatywny wynik zarówno badania na obecność wirusa HPV jak i wymazu cytologicznego oznacza, że badana kobieta nie posiada raka i bardzo mało prawdopodobne jest, że rozwinię się u niej rak wysokiego stopnia przed następną kontrolą którą można wykonać nawet 45 miesięcy później. Obecnie dostępne są również szczepionki chroniące przed niektórymi typami wirusa HPV. Nasza placówka wykonuje zarówno badania na obecność poszczególnych typów wirusa HPV jak również szczepienia przeciw HPV!!!

Jowita

Kordowska

